GASTROENTEROLOGISK LAB.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tlf.: 77 62 69 58 / 77 62 69 35
Fax: 77 66 93 90
www.unn.no/fagfolk/handbok

Prøvetakingsdato — For intern rekvirering i UNN

DAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30
MND. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prøvetakingsrunder — Kjønn

MORGEN 13 -17 -20 -24 -04 — K M

Andre klokkeslett

HELE TIMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
MINUTTER 10 20 30 40 50

Avdeling

KIR Gas Uro Thr P.Kir Ort N.Kir
MED 1a Nyr Hj1 Hj2 Mgas 3b 4 Ger Hj3 Dia Ger Dag 3c
BARN 1 2 Spe
ANESTESI Int Opp Aku Opr
KVINNEKL G1 G2 Ba Fø
ANDRE Ove Onh Hud Krft Nev Rev Bio Klkj Forsk Reh

Fødselsnr. (11 siffer) — Innlagt i institusjon: Ja Nei

Pasient

Adresse

Postnr. — Stue/Seng

For ekstern rekvirering

Kl. — Dato — Journalnr.

Rekvirent — Rekvirentkode

Adresse — Postnr.

Kopi av svar ønskes sendt til

Strekkode PASIENT

Strekkode REKVIRENT

Ønsket mengde: 5-10 gr. (en skje) fæces per glass og et glass for hver analyse.
Fæces er holdbar 2-3 dager i romtemp. og 3 mnd. ved -20°C. Prøver som er frossen sendes som fryseprøver.

Pankreas Elastase 1 i fæces

Referanseområde:
Normal pankreasfunksjon: 200 - >500 µgE1/g fæces
Lett til moderat pankreasinsuffisiens: 100 – 200 µgE1/g fæces
Uttalt pankreasinsuffisiens: < 100 µgE1/g fæces

Calprotectin (Fecaltest) i fæces

Referanseområde:
Normal: < 50 mg/kg

Calprotectin er en test for inflammatoriske prosesser i GI traktus. Hovedindikasjonen er kontroll og oppfølging av pasienter med IBD (ulcerøs colitt/MbCrohn). Negative verdier har høy positiv prediktiv verdi i forhold til IBD, men forhøyede verdier har lav spesifisitet.
Henvisende lege må som alltid sammenholde prøveresultatet med anamnese, tidligere sykehistorie og kliniske funn med tanke på tolkning og evt. videre utredning.

Helicobacter pylori-antigen i fæces

Sensitivitet og spesifisitet for denne testen er begge over 95%.
Helicobacter infeksjon behandles bare såfremt klinisk indikasjon er tilstede.

Viktig: kliniske opplysninger må fylles ut.

01.11. Sentral Grafisk AS