

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Diagnostisk Klinikk – Klinisk Patologi

Boks 46, 9038 Tromsø Tlf. 77 62 72 00

FNR.

NAVN

ADR

TR.KTR

INNEL.



CITO

Telefon svar forutsetter oppgitt bemannet calling/tlf.

Placenta bør undersøkes histologisk ved maternelle eller neonatale komplikasjoner. Indikasjoner (Norsk Veileder i fødselshjelp, 2008):

- Prematur fødsel (< 35 uke)
- Veksthemming (minimum alle med FV < 2500 g)
- Alvorlig asfyksi (Apgar < 6 ved 5 minutter)
- Preeklampsi/eklampsi
- Klinisk chorioamnionitt/perinatal infeksjon
- Misdannelser
- Flerlingsvangerskap
- Unormal placentering/retinert placenta, abruptio placenta og unormalt utseende placenta
- Svulster
- Annet, beskriv:

Til internt bruk

Informasjon om mor/svangerskap/barn (fylles inn):

Svangerskapslengde: _____ uker _____ dager

Fødselsvekt: _____ g

Påvist føtal veksthemming før fødsel: ja nei

Kjent diabetes mellitus hos mor: ja nei

Materialet består av placenta, fiksert i formalin dato _____

Underskrift _____

Preparatbeskrivelsen må ikke benyttes til publikasjon uten samtykke fra vårt laboratorium